

Số: 1062/KSBT-TTGDSK

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 6 năm 2023

V/v trả lời phản ánh ý kiến của
bà Huyền Trinh trên chuyên mục
HỎI - ĐÁP.

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 2832 /SYT-KHNVTC ngày 23/6/2023 của Sở Y tế Ninh Thuận về việc yêu cầu trả lời ý kiến phản ánh của bà Huyền Trinh trên chuyên mục HỎI - ĐÁP, nội dung câu hỏi như sau:

“Cho em hỏi. Như mũi vaccin 6 in 1 phải chích cho trẻ trước khi trẻ mấy tháng mới hiệu quả. Bé có uống 1 liều bại liệt vậy có chích được mũi 6 in 1 không. Kính nhờ cơ quan chức năng giải đáp. Em xin cảm ơn!”

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trả lời như sau:

Vắc xin 6 trong 1 hiện nay có 02 loại lưu hành trên thị trường Việt Nam là Hexaxim (Công ty của Pháp sản xuất) và Infanrix Hexa (Công ty của Bỉ sản xuất).

Theo thông tin kê toa 02 loại vắc xin được chỉ định tiêm cho trẻ từ 02 tháng tuổi (đủ 60 ngày tuổi) trở lên, liệu trình 03 mũi cơ bản và khoảng cách tối thiểu giữa các mũi tiêm là 01 tháng.

Việc bé đã có uống 01 liều vắc xin ngừa bệnh bại liệt (vắc xin OPV- vắc xin ngừa bệnh bại liệt dạng uống) không ảnh hưởng đến việc tiêm vắc xin 6 trong 1 và vẫn được tiêm vắc xin 6 trong 1 bình thường theo liệu trình đã khuyến cáo. Theo tài liệu Hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương việc cùng uống vắc xin OPV và tiêm vắc xin IPV là an toàn và không ảnh hưởng đến khả năng sinh miễn dịch phòng bệnh của vắc xin. Trên thực tế, sử dụng 2 vắc xin cùng lúc sẽ tạo miễn dịch phòng bệnh tốt hơn cho trẻ.

Trên đây là nội dung trả lời theo yêu cầu của người dân trên chuyên mục HỎI - ĐÁP, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính báo cáo Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGD (BS Ngọc);
- Lưu: VT, KSBTN, TTGDSK.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Trọng Hoàng Vinh